





Podkôrny hmyz v Tatrách

Ján Ferenčík, Výskumná stanica a Múzeum ŠL TANAPu
Stará Lesná 20. – 21. 11. 2008

19. november 2004



Spracovanie vetrovej kalamity
95 % postihnutého územia






Nespracovaná kalamita len ŠL TANAPu 163 000 m³




Sucháre 2005 /14 ha
Vyťažené 29 tis m³ / 120 ha



Sucháre 2006 / 44 ha
Vyřazené 130 tis. m³ / 520 ha




Sucháre 2007 / 826 ha
vytážené 115 tis. m³ / 460 ha




Sucháre 2008 / 293 ha
vytážené 123 tis. m³ / 492 ha



Stojace sucháre – október 2008
1120 ha




Mapovanie suchárov




Vývoj priemerných odchytov lykožrúta smrekového

Spolu odchytané 350 mil. ks



Vývoj odchytní lykožrúta lesklého

Spolu odchytené 296 mil. ks



Lykožrút smrekovcový *Ips cembrae* – lokálny problém





Borovica sosna – hostiteľ podkôrníkov

Podkôrniky na limbe *Ips typographus*, *Pityogenes chalcographus*, *Ips amitinus*






Kosodrevina reálna hrozba napadnutia

Suché stromy 2008

kosodrevina výmera 17 548 ha





Ďakujem za pozornosť.